



# Bolfo®

## Bolfo® collar Αντιπαρασιτικό περιλαίμιο για σκύλο και γάτα

Εναντίον των ψύλλων και των κροτώνων  
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

**ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ**

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:

**Bayer Animal Health GmbH**  
D-51368 Leverkusen, Germany

Παραγωγός υπεύθυνος για την απελευθέρωση των παρτίδων:

**KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH**

Projensdorfer Str. 324

D-24106 Kiel, Germany

Τοπικός Αντιπρόσωπος στην Ελλάδα:

**PROVET A.E.**

Λεωφ. Ποσειδώνος 77

174 55 Άλιμος, Αττική

Τηλ.: +30 2105575770-3

Fax: +30 2105575830

E-mail: vet@provet.gr

Τοπικός Αντιπρόσωπος στην Κύπρο:

**ACTIVET LTD**

Αντρέα Μισούλη 50

2415 Έγκωμη, Λευκωσία

Τηλ.: 00357 22591918

Fax: 00357 22591917

E-mail: info.activet@cytanet.com.cy

**ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ**  
**BOLFO® collar**

**ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ**

Ένα περιλαίμιο για κάθε ζώο

Αφαιρέστε την προστατευτική συσκευασία από το περιλαίμιο, ξεδιπλώστε και αφαιρέστε τις πλαστικές ταινίες από το εσωτερικό του περιλαΐμιου.

Εφαρμόστε το περιλαίμιο χαλαρά, γύρω από το λαιμό του ζώου και προσαρμόστε το τραβώντας την περίσσεια από το κούμπωμα.

Οι χρήστες θα πρέπει να ελέγχουν το δέρμα στην περιοχή του περιλαΐμιου κατά τη διάρκεια των πρώτων ημερών, για να βεβαιωθούν ότι το περιλαίμιο δεν είναι σφικτό (θα πρέπει να διατηρείται απόσταση περίπου δύο δακτύλων μεταξύ του λαιμού και του περιλαΐμιου).

Το περιλαίμιο θα πρέπει να φοριέται συνεχώς.

Διάρκεια προστασίας κατά των ψύλλων:

μέχρι 4 μήνες

Διάρκεια προστασίας κατά των κροτώνων:

μέχρι 10 εβδομάδες

Όταν η αποτελεσματικότητα μειωθεί, εφαρμόστε νέο περιλαίμιο.

Η δράση κατά των ψύλλων αρχίζει εντός λίγων ωρών.

Οι κρότωνες φονεύονται έπειτα από μία ημέρα.

Απομακρύνονται εύκολα ή αποπίπτουν.

Το περιλαίμιο είναι αποτελεσματικό είτε το ζώο κινείται ή αναπαύεται. Η διάρκεια της προστασίας εξαρτάται από το μήκος και την κατάσταση του τριχώματος, τη δραστηριότητα του ζώου και το επίπεδο της παρασίτωσης.

Μολονότι το περιλαίμιο BOLFO είναι υδατοστεγές, συνιστάται η αφαίρεσή του κατά τη διάρκεια του λουτρού.

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ**

Μόνο για εξωτερική χρήση.

Να πλένετε τα χέρια σας μετά την εφαρμογή του περιλαΐμιου.

Να μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν.

**ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ**

Δεν απαιτείται.

**ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ**

Φυλάσσεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Να διατηρείται κλειστό μέχρι τη χρήση.

Φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά, τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές.

**ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)**

Το περιβάλλον του ζώου αποτελεί μία ανεξάντλητη πηγή για την εμφάνιση παρασιτώσεων από ψύλλους, και θα πρέπει να αντιμετωπίζεται επαρκώς και παράλληλα με τα ζώα, έτσι ώστε να επιτευχθεί καλύτερο το επιθυμητό αποτέλεσμα στα ζώα.

Οι ψύλλοι είναι οι ενδιάμεσοι ξενιστές ταινιών των σκύλων και των γατών. Ως εκ τούτου, θα πρέπει η θεραπεία κατά των ψύλλων να συνδυάζεται με ανθελμινθική θεραπεία. Δε θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα στα ζώα άλλα παρασιτοκτόνα.

Σε περίπτωση δηλητηρίασης χρησιμοποιήστε θεική ατροπίνη.

**ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ**

**Ανά περιλαίμιο:**

2-Isopropoxyphenyl-N-methylcarbamate 4,442 g

(μεγάλο περιλαίμιο)

2-Isopropoxyphenyl-N-methylcarbamate 1,234 g

(μικρό περιλαίμιο)

**Έκδοχα:**

Di-n-butyl-adipate, Propylene glycol dicaprylocaprate, Epoxidized soybean oil, Stearic acid, Pigment mixture\*, Polyvinylchloride

\*The pigment mixture has the following composition:

Titanium dioxide, Iron oxide yellow, Iron oxide red, Iron oxide black

**ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)**

Ενδείκνυται για την αντιμετώπιση παρασιτώσεων στα ζώα από ψύλλους και κρότωνες.

**ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ**

Να μη χρησιμοποιείται σε ασθενή και εξασθενημένα ζώα.

**ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**

Ειδικά τις πρώτες ημέρες μετά την εφαρμογή του περιλαΐμιου, είναι δυνατόν να παρατηρηθεί ερεθισμός στο δέρμα/κνησμός σε υπερευαίσθητα ζώα.

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.

**ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ**

Σκύλος, Γάτα

**ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ**

Συμβουλευθείτε τον κτηνίατρό σας για τον τρόπο απόρριψης των χρησιμοποιηθέντων φαρμάκων. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος.

**ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ**

Κουτί με ένα περιλαίμιο για μικρόσωμους σκύλους και

γάτες μήκους 380 ± 38,0 mm σε σακουλάκι αλουμινίου

Κουτί με ένα περιλαίμιο για μεγαλόσωμους σκύλους

μήκους 700 ± 70,0 mm σε σακουλάκι αλουμινίου

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

A.A.K. στην Ελλάδα: 752/09-01-2013/K-0007604

A.A.K. στην Κύπρο: 17910

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας.

**\*χορηγείται με συνταγή κτηνίατρου\***  
**ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ**  
**ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ**  
**ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ:**  
**+30 210 7793777**

**ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ**

Bayer