

## Exitel Cat εύγευστα δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο για γάτες Pyrantel, Praziquantel



### ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

1 δισκίο επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο 230 mg Pyrantel embonate και 20 mg Praziquantel.

Λευκό έως υπόλευκο επικαλυμμένο δισκίο με εγχάραξη στη μια πλευρά.

### ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)

Για την αντιμετώπιση μεικτών μολύνσεων που προκαλούνται από ασκαρίδες και ταινίες του γαστρεντερικού συστήματος:

Ασκαρίδες: *Toxocara cati*, *Toxascaris leonine*

Ταινίες: *Dipylidium caninum*, *Taenia taeniaeformis*, *Echinococcus multicularis*

### ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Να μη χορηγείται ταυτόχρονα με προϊόντα που περιέχουν πιπεραζίνη.

Να μη χορηγείται σε γατάκια μικρότερης ηλικίας των 6 εβδομάδων.

Να μη χορηγείται σε ζώα με γνωστή υπερευαισθησία στα δραστικά συστατικά ή κάποιο από τα έκδοχα.

### ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Καμία γνωστή

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.

### ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ

Γάτες

### ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Δοσολογία

Τα συνιστώμενα επίπεδα δόσης είναι: 20 mg/kg pyrantel (57.5 mg/kg pyrantel embonate) και 5 mg/kg praziquantel. Αυτό ισοδυναμεί με 1 δισκίο ανά 4 kg σωματικού βάρους.

### Σωματικό βάρος Δισκία

1.0 - 2.0 kg	½
2.1 - 4.0 kg	1
4.1 - 6.0 kg	1 ½
6.1 - 8.0 kg	2

Τρόπος χορήγησης και διάρκεια της θεραπείας

Εφάπαξ χορήγηση από το στόμα. Το δισκίο πρέπει να χορηγείται απευθείας στη γάτα, αλλά αν είναι απαραίτητο μπορεί να αναμιχθεί με την τροφή του.

Σε περίπτωση μόλυνσης από ασκαρίδες, ιδιαίτερα σε νεαρά γατάκια, δεν μπορεί να

αναμένεται πλήρης εξάλειψη, με αποτέλεσμα να παραμένει ένας κίνδυνος μόλυνσης στον άνθρωπο. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να διενεργούνται επαναλαμβανόμενες θεραπευτικές αγωγές με ένα προϊόν κατάλληλο για τις ασκαρίδες σε μεσοδιαστήματα 14 ημερών μέχρι 2-3 εβδομάδες μετά τον απογαλακτισμό.

#### ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Για να διασφαλιστεί η σωστή δόση, πρέπει να προσδιορίζεται όσο ακριβέστερα είναι δυνατόν.

#### ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά  
Να μη χρησιμοποιείται μετά από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο blister και στο κουτί  
Να απορρίπτονται τα μη χρησιμοποιημένα μισά δισκία.  
Να φυλάσσεται το blister στην εξωτερική συσκευασία

#### ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)

Ειδικές προφυλάξεις για χρήση σε ζώα

Να μη χρησιμοποιείται κατά την κύηση αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη γαλουχία. Μετά από χορήγηση πενταπλάσιας της συνιστώμενης δόσης, έχουν παρατηρηθεί συμπτώματα μη ανεκτικότητας όπως έμετος.

Η ανθεκτικότητα των παρασίτων σε μια συγκεκριμένη κατηγορία ανθελμινθικών μπορεί να προκύψει μετά από συχνή και επαναλαμβανόμενη χρήση ενός ανθελμινθικού από αυτή την κατηγορία.

Οι ψύλλοι χρησιμεύουν ως ενδιάμεσοι ξενιστές για έναν κοινό τύπο ταινίας το *Dipylidium caninum*.

Η μόλυνση από ταινίες είναι βέβαιο ότι θα επανεμφανίζεται εάν δεν καταπολεμηθούν οι ενδιάμεσοι ξενιστές των παρασίτων όπως οι ψύλλοι, μύες κ.α.

Ειδικές προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται κατά τη χορήγηση του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος στα ζώα

Σε περίπτωση τυχαίας κατάποσης, να αναζητήσετε ιατρική συμβουλή και δείξτε το φύλλο οδηγιών χρήσεως στον ιατρό.

Στα πλαίσια της καλής υγιεινής, τα άτομα που χορηγούν δισκία απευθείας σε μια γάτα ή την προσθέτουν στην τροφή της γάτας θα πρέπει να πλένουν τα χέρια τους μετά.

Αποκλειστικά για κτηνιατρική χρήση.

#### ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Συμβουλευθείτε τον κτηνίατρο σας για τον τρόπο απόρριψης των χρησιμοποιημένων φαρμακευτικών προϊόντων. Αυτά τα μέτρα αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος.

#### ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

##### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 28, 30, 32, 36, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 56, 60, 64, 68, 70, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96, 98, 100, 104, 106, 108, 112, 116, 120, 128, 136, 140, 144, 150, 152, 160, 168, 176, 180, 184, 192, 200, 204, 206, 208, 216, 224, 232, 240, 248, 250, 280, 300, 500 ή 1000 tablets.

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

A.M.K. 72944 / 23-7-2014